

XVI CONVENCION AMVEC. SEPTIEMBRE 1960

AUTORES: M.V.Z. RAMON JUVERA M.  
M.V.Z. CARLOS BARRAÑON J.

MANEJO DE LECHONES DURANTE 35 DIAS POST DESTETE

Todas las Etapas de la Porcicultura son importantes y es difícil poder decir cuál requiere más atención, pero en general podemos decir que en orden de importancia por -- las pérdidas económicas que originan se pueden enumerar en el siguiente orden : 1o. Pie de Cría, 2do. Maternidades, 3ro. Destetes y 4to. Engordas.-

Esta vez nos referimos a una serie de manejos que cree -- mos nos hán llevado a obtener unos buenos resultados en el área de las iniciaciones.- Este trabajo se realizó co lectando datos de una Granja Productora de cerdos para -- el abasto localizada en la Región sur del Estado de Sono ra con temperaturas máximas de 48°C y mínimas de 6°C.-

Las características del alojamiento utilizado, que en ge neral se pueden considerar buenas, son las siguientes :

- 1ro. .30 M2. de espacio por cerdo
- 2do. 16 a 18 cerdos por corral
- 3ro. Piso de Slat de concreto
- 4to. Un bebedero por corral
- 5to. Fuente de calor a base de focos infrarojos
- 6to. Comedero con 5 bocas por corral
- 7mo. Alimento elaborado en la misma Granja
- 8vo. Edificio abierto ( en Invierno se tapa -- con plástico).-

En esta Granja se desteta a un promedio de 27 días de -- edad y con un peso promedio de 6.5 Kgs.

Los principales manejos que se realizan son los siguientes:

- 1ro. Se recibe a los lechones con agua medicada a base de antibiotico, electrolitos y vita minas, esta agua se proporciona como única

Fuente de bebida por un máximo de 7 días y un mínimo de 4 dependiendo del Estado de los animales.-

- 2do. Los lechones al momento del destete se seleccionan por tamaños y los retrazados se apartan para proporcionarles cuidados especiales que consisten principalmente de tratamiento por lo menos durante 3 días seguidos de una solución a base de suero, complejo "B", Tetraciclina ó Tylosina ó Lincomicina.- Este mismo tratamiento también se aplica a los lechones de buen tamaño que se observan decaídos.-
- 3ro. Se desparasitan todos los cerdos a los 5 días de destetados a base de Carbonato de Metil-5-Butil-2-Benzimidazole (Verminum).-
- 4to. Se vacunan contra el colera porcino a los 15 días después del destete.-
- 5to. De Octubre a Junio se aplica bacterina a base de hemofilos, Bordetela y Pasterela a los 21 días de destetados ( también en maternidad a los 24 días de edad ).-

Los resultados obtenidos en un período que abarca 20 meses, -- son los siguientes :

EDAD PROM. DE DESTETE . . . . .	27
LECH. QUE INICIARON EN SALA DE DESTETE. . .	15,770
PESO DE INICIACION EN SALA DE DESTETE . .	105,421.5
PESO PROM. INICIACION EN SALA DESTETE . .	6.585
DIAS EN SALA DE DESTETE . . . . .	34
LECHONES MUERTOS . . . . .	215
PORCENTAJE DE MORTANDAD . . . . .	1.4%
LECH. QUE TERMINARON EN SALA DE DESTETE .	15,505
PESO AL SALIR DE SALA DE DESTETE. . . . .	189,811.3
PESO PROM. AL SALIR DE SALA DE DESTETE. .	12.241
GANANCIA EN KILOS . . . . .	84,470.0
GANANCIA POR LECHON . . . . .	5.448
GANANCIA DIARIA POR CERDO . . . . .	0.150
ALIMENTO TOTAL CONSUMIDO. . . . .	234,212.0
ALIMENTO TOTAL CONSUMIDO POR CERDO. . . .	15.155
ALIMENTO TOTAL CONSUMIDO POR CERDO DIARIO	0.435
CONVERSION ALIMENTICIA. . . . .	2.782

De la información anterior puedo concluir que los resultados obtenidos nos indican que se cuenta con un buen manejo en el que sobresale el 1.4% de mortandad como cosa positiva y por el contrario podemos observar que la ganancia diaria por cerdo de .160 Kgs. se puede considerar como un mal resultado.--

En el momento presente estamos realizando cambios tendientes a mejorar todos los Indices de la etapa y entre los más importantes tenemos los siguientes :

- a).- Sistema todo dentro todo fuera.-
- b).- Uso de mallas ó metales en pisos.-
- c).- Sistema de ambiente controlado.-

Todo lo anterior esperamos se traduzca en obtener menos del 1% de mortandad y una ganancia diaria promedio de .250 Kgs.