

XVII CONVENCION AMVEC - IXTAPA 81

Hotel Holiday Inn



Del 1 al 5 de Julio de 1981

TITULO ¿PORQUE NO DESTETAR A LA 3a. SEMANA?

AUTOR (ES) M.V.Z. JOAQUIN GARCIA RIVAS.

RESUMEN

Se analizan las posibles ventajas que se pudieran obtener en una granja en donde se estableciera un sistema de destete a la 3a. semana, en comparación con los riesgos de una sensible reducción en la productividad de la explotación.

Ventajas:

- Reducción del período destete - celo.
- Reducción del tiempo de ocupación de las instalaciones
- Reducción del consumo de alimento por parte del pie de cría.
- Mayor uniformidad en el peso de las camadas

Riesgos:

- Reducción en la supervivencia embrionaria en subsiguientes gestaciones.
- Reducción en el tamaño de las camadas en subsiguientes partos.
- Riesgo de complicaciones al momento del destete debido a una baja de la protección inmunológica tanto activa como pasiva al efectuar el destete a 21 días.

Insuficiente aprovechamiento del alimento sólido debido a un insuficiente desarrollo de las enzimas digestivas a los 21 días de vida del lechón.

Complicaciones en la hembra al efectuar el destete cuando la hembra se encuentra en el pico de su lactación.

El trabajo se concluye que debido a los riesgos de este sistema sólo se debe intentar establecer un sistema de destete a la 3a. semana, cuando el promedio de la granja sea de por lo menos 2.3 partos por hembra por año.