

II A.L.V.E.C.  
XXII A.M.V.E.C.  
III U.N.P.C.

TITULO : LA HISTOPATOLOGIA COMO RECURSOS DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA INTESTINAL PORCINA.

AUTOR (ES) : Elio Sogbe M., \* A. Boulanger, \*V. Utrera.

INSTITUCION (ES) : Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Veterinarias  
Maracay Edo. Aragua. Venezuela. Apdo. 4563.

## Resumen

Se presentan casos de Patología Patología Porcina en los cuales es fundamental el aporte de la histopatología ofreciendo resultados rápidos y precisos básicos para el tratamiento, cuando por evaluación clínica, parasitológica y bacteriológica es dificultoso el diagnóstico.

1. COCCIDIOSIS: Se presentan casos de cuadros diarreicos en los cuales los exámenes parasitológicos resultaron negativos (flotación de WILLYS) a la presencia de coccidias, igualmente los frotis por eposición sobre mucosa intestinal fueron infructuosos para el diagnóstico. En esos casos el estudio histológico fue capaz de detectar formas parasitarias intraepiteliales de Coccidias en 24-48 horas, permitiendo iniciar el tratamiento precozmente.

2. ADENOMATOSIS INTESTINAL PORCINA: Se presentan casos de cuadros diarreicos en los cuales el diagnóstico clínico, macroscopico y bacteriológico no fueron suficientes para realizar un diagnóstico definitivo; la histopatología en estos casos es característica y apoyados en coloraciones especiales se define al agente causal.-

3. CASOS DE PARASITOSIS EN TRACTO DIGESTIVO POR ESOFAGOSTUMOS; en los cuales no se evidenció el parásito macroscópicamente, y solo se puso de manifiesto en la submucosa, donde originaba cuadro de disturbio gastro intestinal de etiología incierta. El Diagnóstico en esta fase de ubicación larvaria es importante y genera un tratamiento específico.

4. CASOS DE DISENTERIA INTESTINAL PORCINA, donde a pesar del aspecto típico macroscópico el diagnóstico definitivo es histológico y comprobada la presencia de TREPONEMAS utilizando coloraciones específicas (WARTHIN STARRY)